

按时接种“小苗苗” 儿童健康少烦恼

国家免疫规划疫苗儿童免疫程序表（2026年版）

可预防疾病	疫苗种类	接种途径	剂量	英文缩写	接种年龄														
					出生时	1月	2月	3月	4月	5月	6月	8月	9月	18月	2岁	3岁	4岁	6岁	13岁
乙型病毒性肝炎	乙肝疫苗	肌内注射	10 或 20μg	HepB	1	2					3								
结核病 ¹	卡介苗	皮内注射	0.1mL	BCG	1														
脊髓灰质炎	脊灰灭活疫苗	肌内注射	0.5mL	IPV			1	2											
	脊灰减毒活疫苗	口服	1 粒或 2 滴	bOPV					3								4		
百日咳、白喉、破伤风 ²	百白破疫苗	肌内注射	0.5mL	DTaP			1		2		3			4				5	
麻疹、风疹、流行性腮腺炎	麻腮风疫苗	皮下注射	0.5mL	MMR								1		2					
流行性乙型脑炎 ³	乙脑减毒活疫苗	皮下注射	0.5mL	JE—L								1			2				
	乙脑灭活疫苗	肌内注射	0.5mL	JE—I								1、2			3			4	
流行性脑脊髓膜炎	A 群流脑多糖疫苗	皮下注射	0.5mL	MPSV—A							1		2						
	A 群 C 群流脑多糖疫苗	皮下注射	0.5mL	MPSV—AC												3		4	
甲型病毒性肝炎 ⁴	甲肝减毒活疫苗	皮下注射	0.5 或 1.0mL	HepA—L										1					
	甲肝灭活疫苗	肌内注射	0.5mL	HepA—I										1	2				
人乳头瘤病毒感染 ⁵	双价人乳头瘤病毒疫苗	肌内注射	0.5mL	2vHPV															1、2

注：1. 主要指结核性脑膜炎、粟粒性肺结核等。
2. 免疫规划使用的白破疫苗（DT）仅用于 7—11 周岁儿童补种。
3. 选择乙脑减毒活疫苗接种时，采用两剂次接种程序；选择乙脑灭活疫苗接种时，采用四剂次接种程序，其中第 1、2 剂间隔 7—10 天。
4. 选择甲肝减毒活疫苗接种时，采用一剂次接种程序；选择甲肝灭活疫苗接种时，采用两剂次接种程序。
5. 双价人乳头瘤病毒疫苗采用两剂次接种程序，第 1、2 剂间隔 6 个月。



国家疾控局 国家卫生健康委
中国健康教育中心 制作